

## Nature

# Les bébés chouettes effraies sont en mal de berceau

Avec sa silhouette fantomatique et son inimitable cri, l'effraie a longtemps été injustement mal-aimée. Si elle bénéficie aujourd'hui d'une meilleure image, elle peine à trouver des lieux pour y élever ses petits.

## ● Pouvez-vous nous présenter l'effraie ?


Son plumage est très clair par rapport aux autres rapaces nocturnes bourguignons, de couleur blanche, tout au plus un peu rousse. C'est une chouette liée aux milieux ouverts (bocages, prairies, cultures), qui se reproduit dans les bâtis humains. Autrefois, c'était la moins rare des rapaces nocturnes avec la chouette hulotte, mais elle a subi une forte régression. On compte à présent 1 500

couples en Côte-d'Or il y a 50 ans, un nombre qui a diminué de moitié. Avec l'effondrement de pigeonniers, la transformation de fermes en résidences secondaires, l'effraie ne trouve plus de sites de reproduction. Son nom complet est effraie "des clochers", mais ceux-ci sont presque tous engrillagés contre les pigeons, ce qui ne lui permet plus d'y nicher.

## ● Que faire pour lui venir en aide ?

Aménager des nichoirs sur toutes les communes bourguignonnes participerait à rétablir ses effectifs. Peu importe que le bâtiment soit ancien ou moderne. En revanche, il faut que le nichoir soit situé à au moins 5 mètres du sol. Les dimensions sont de taille : une caisse de 100 cm de long pour 50 cm de large et de haut. Déposer quelques centimètres de sciures, de copeaux de bois, ou de paille sur le fond évitera que les œufs ne roulent. Le nichoir doit impérativement être équipé d'un dispositif anti-prédation contre les fouines. Cela consiste à fixer au niveau du trou d'entrée un

SACRÉ  
BERCEAU  
QUAND  
MÊME !



morceau de tube coupé en biais, de 40 cm de longueur en haut et 30 cm en bas. Un plan de montage et des photos sont à consulter sur [www.lachoue.fr](http://www.lachoue.fr).

## ● Comment savoir si un nichoir est habité ?

Il ne faut surtout pas soulever le couvercle, ni provoquer de quelconque dérangement

lorsque le nichoir est potentiellement occupé. En se postant à proximité bien caché, il est facile de voir une chouette s'envoler, ou d'entendre les soufflements des jeunes. Les adultes émettent aussi des soufflements en guise de cris de contact et n'ont pas de chant, mais un cri aigu prolongé assez désagréable. La période de nidification est variable

en fonction de la disponibilité en nourriture. Certaines années où les ressources manquent, l'espèce ne se reproduit pas du tout. S'il y a beaucoup de campagnols, elle peut faire une première couvée fin février et une seconde fin juin. Le plus souvent, il n'y a qu'une couvée courant avril. Les jeunes séjournent à peu près deux mois dans le nid, jusqu'à ce qu'ils sachent voler.

## Paroles d'expert

La pose d'un nichoir à effraies représente un travail plus conséquent que pour un nichoir à mésanges. Il s'agit donc de concentrer les efforts aux bons endroits et de ne pas choisir un site trop proche d'un nichoir déjà en place. Mieux vaut respecter un kilomètre de distance. La Choue a déjà procédé à la pose de plus de 450 nichoirs en Côte-d'Or et d'une bonne soixantaine en Saône-et-Loire. Ils sont tous répertoriés avec relevé GPS. Si vous projetez d'installer un nichoir, ou que vous avez connaissance d'un nichoir

existant, n'hésitez pas à contacter **La Choue** en Côte-d'Or ([contact@lachoue.fr](mailto:contact@lachoue.fr)) ou l'**AOMSL** en Saône-et-Loire ([aomsl.ornithologie@wanadoo.fr](mailto:aomsl.ornithologie@wanadoo.fr)) pour bénéficier de conseils ou remonter l'information. La région serait efficacement couverte avec une moyenne de 2 à 3 nichoirs par commune. Toutes les 5 nichées environ, en fin d'année, il est bienvenu d'effectuer un nettoyage du nichoir pour évacuer les **pelotes de réjection** qui s'y sont amoncelées.

**Hugues Baudvin** ● Naturaliste à La Choue



## Pour en savoir plus ►

### ● Mini-glossaire

**AOMSL** : Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire.

**La Choue** : association pour l'étude et la protection des rapaces nocturnes en Bourgogne Franche-Comté.

**Pelote de réjection** : restes alimentaires non digérés par l'oiseau, composés de poils, de plumes et d'os, recrachés par le bec sous forme de pelote.

### ● Un article



Retrouvez l'article complet pour la préservation des chouettes effraies dans le n°40 de la revue scientifique *BFC Nature*. Vous pouvez commander votre exemplaire sur [www.bfcnature.fr](http://www.bfcnature.fr), à [contact@bfcnature.fr](mailto:contact@bfcnature.fr) ou au 03 86 76 07 36.

## ► Partenariat

Cette page est réalisée en partenariat avec l'association fédératrice Bourgogne Franche-Comté Nature, association rassemblant 31 structures ayant trait à la biodiversité. Une coopération nécessaire afin de mieux « transmettre pour préserver ».

## ► Crédits

Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en chef de Bourgogne-Franche-Comté Nature et directeur de la SHNA-OFAB. Illustration : Daniel Alexandre. Rédaction : Alice Despinoy avec la collaboration de Hugues Baudvin